

Informació important per al client sobre l'anestèsia.

Aquest document està destinat a informar-los sobre l'anestèsia, tant dels seus avantatges com dels seus riscos, així que demanem si us plau, el llegeixin atentament per tal de donar el seu consentiment firmat i així poder procedir a l'anestèsia que necessita el seu animal.

Qualsevol dubte que els hi pugui sorgir sobre aquest procediment, no dubtin a preguntar-nos-ho.

Per què s'ha d'anestesià el seu animal?

Primer de tot volem aclarir dos conceptes diferents.

Per una banda el seu animal pot necessitar una **sedació**, el que aconseguim amb aquest procediment és calmar o relaxar l'animal a través de l'administració de fàrmacs. La sedació no acostuma a buscar una inconsciència completa del pacient.

En canvi la finalitat de l'anestèsia és aconseguir l'anul·lació total o parcial de la sensibilitat, amb o sense pèrdua de consciència i la immobilització total del animal, obtinguda gràcies a l'administració de fàrmacs anestèsics i gasos inhaladors. Per aconseguir una anestèsia general s'acostuma a començar amb una sedació prèvia.

Tant l'anestèsia com al sedació, són procediments necessaris per a poder dur a terme procediments quirúrgics simples o complexos amb major seguretat i eficàcia.

Tindrà dolor el meu animal?

Mitjançant l'administració associada de medicaments analgèsics, assegurem evitar qualsevol patiment del seu animal.

Quins riscos comporta una sedació o una anestèsia?

Qualsevol acte mèdic, inclús conduït amb competència i respectant els coneixements científics actuals, comporten un risc.

Aquest risc depenen tant de l'estat de salut del seu animal com el procés mèdic/quirúrgic pel qual és processa l'anestèsia o sedació.

Aquest risc es classifica de l'1 (lleu) al 5 (risc molt elevat).

Durant l'anestèsia general o sedació així com amb una anestèsia local poden sorgir complicacions i imprevistos que poden posar en risc la vida del seu animal.

Per exemple: Una parada cardiorespiratòria o una reacció al·lèrgica a un fàrmac o excipient sense que hi hagi negligència per part del equip mèdic. La existència d'aquest riscos ha de ser entesa i acceptada per vostès.

Recomanacions

Abans de l'anestèsia programada:

- Proves prèvies: és recomanable fer una analítica i un electrocardiograma a l'animal per intentar reduir els riscos de l'anestèsia.
- Dejú de sòlids: En el cas dels gossos s'ha de realitzar dotze hores abans del procés. mentre que en el cas dels gats amb 6 hora és suficient.
- Eliminar la ingestió de líquids unes 4-6 hores abans del procediment.

*(Fent el dejú evitem possibles vòmits que ens puguin provocar una pneumònia ,**pot arribar a ser perillós per la vida del seu animal**)*

Després de la sedació/anestèsia:

- És possible que el seu animal presenti zones del seu cos rasurades.
- És possible que el seu animal durant uns dies després de l'anestèsia presenti tos. Això és degut al tub endotraqueal que fem servir a l'hora d'intubar-los per procedir amb l'anestèsia inhalatòria.
- És recomanable que quan torneu a casa col·loqueu l'animal en un lloc tranquil, sense gaire soroll ni llum i en una zona temperada.
- L'animal podrà tornar a beure aigua i a menjar d'acord amb les pautes que el veterinari us recomani.